IDENTIFY-HFpEF

COW
Clinical Operations WCN

WCN

Zakkaartje_A6_105x148mm_v04.indd 1 13-03-2026 09:29

IDENTIFY-HFpEF

IDENTIFY-HFpEF
Identification of Undiagnosed HFpEF Patients through Pragmatic Secondary Care Screening in the Netherlands

klachten

Verwijzing dyspneu, vermoeidheid of oedemen

diagnostiek

Bepalen H2HFpEF-score

Score 0-2?
Overweeg ondanks score:
NTproBNP + echo

Score 3-9?
55% kans op HFpEF
Bepaal NTproBNP + verricht echo

behandeling & verdere diagnostiek

Score 0-1?
overweeg alternatieve diagnose

Score 2-5?
overweeg verdere diagnostiek/ behandeling

Score 6 of meer?
start behandeling (90% HFpEF)

	Klinische variabele (Engels)	Omschrijving	Punten
H_2	**H**eavy	te zwaar; BMI > 30kg/m²	2
	Hypertensive	hypertensief, gebruikt 2 of meer antihypertensiva	1
F	**A**trial Fibrillation	paroxysmaal of persisterend boezemfibrilleren	3
P	**P**ulmonary Hypertension	doppler-echocardiografisch geschatte systolische druk in de A. pulmonalis > 35 mmHg	1
E	**E**lder	leeftijd > 60 jaar	1
F	**F**illing Pressure	doppler-echocardiografisch gemeten vullingsdruk, E/e' >9	1
H2FpEF-score			**SOM (0-9)**

Totaal aantal punten

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Waarschijnlijkheid HFpEF

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95

BMI, Body Mass Index; HFpEF, hartfalen met behouden ejectiefractie (LVEF ≥ 50%)

Bewerkt naar Reddy YNV et al. Circulation 2018;138:861-870

Behandeladvies:

- **Klasse IA** aanbeveling voor **SGLT2-remmers**
  (dapagliflozine, empagliflozine)
- *Zo nodig* **lisdiuretica**
  - Onder controle van **nierfunctie, elektrolyten** en **klinische status**

Zoek en behandel risicofactoren / comorbiditeiten bij HFpEF
(leefstijl, cardiale revalidatie en zo nodig medicatie)

Cardiovasculaire risicofactoren	Geassocieerde comorbiditeiten
Hypertensie	Ischemisch hartlijden (incl. microvasculair)
Overgewicht / obesitas	Atriumfibrilleren
Diabetes mellitus	Chronotrope incompetentie Pulmonale hypertensie*

*PHT: vaak secundair aan HFpEF; sluit andere PH-types uit.

HFpEF 'look-alikes'*
Zoek actief naar een specifieke en behandelbare etiologie

Ziektebeeld	Klinische / echografische aanwijzingen
Kleplijden	Regurgitatie of stenose, afwijkende klepmorfologie
Cardiale amyloïdose	LVH zonder duidelijke hypertensie, pericardvocht, niet-cardiale rode vlaggen (bv. CTS, neuropathie)
Hypertrofische cardiomyopathie	Asymmetrische LVH, LVOTO, SAM
Constrictieve pericarditis	Septal bounce, verdikt pericard, respiratoire variatie mitrale E-golf

*Zie leidraad HFpEF op de WCN website

IDENTIFY-HFpEF

Identification of Undiagnosed HFpEF Patients through Pragmatic Secondary Care Screening in the Netherlands

Meer weten over IDENTIFY-HFpEF?

Neem contact op met:
Kirsten Buitenhuis,
arts-onderzoeker
identify@erasmusmc.nl

Zakkaartje_A6_105x148mm_v04.indd 4 13-03-2026 09:29